

פירוט הטיפול הרפואי, שהבייבי שלך יעבור אחרי הלידה

טיפות עיניים/משחה אנטיביוטית: מיועד למניעת זיהומים בעיניים מהמעבר בתעלת הלידה.

זריקה של ויטמין K: ויטמין K אמור לעודד את תפקודה של מערכת קרישת הדם שמתפתחת באופן טבעי רק 48 שעות מהלידה, ובכך להגן על דימומים מסבכי חיים. בבתי החולים בארץ נותנים את הוויטמין בזריקה לירך יש אפשרות לתת אותו בטיפות אך צריך לרכוש אותם לפני הלידה באופן פרטי ולהביא אותו לבית החולים.

חיסון צהבת B: החיסון הראשון מסדרה של 3 חיסונים ניתן כאשר התינוק בן 24 שעות, ניתן לבקש לדחות את החיסון ולתת אותו מאוחר יותר בטיפת חלב.

בדיקת TSH: בדיקת דם הבודקת את תפקוד בלוטת התריס (תת פעילות), איתור מוקדם יאפשר מתן טיפול תרופתי וימנע פיגור. במידה וידוע לנו על בעיות במשפחה של בלוטת התריס מומלץ לפנות לבדיקות נרחבות יותר לאחר השחרור מבית החולים.

בדיקת PKU: בדיקת דם המבוצעת כעבור 48 שעות מהלידה ובודקת ליקוי אפשרי בחילוף החומרים של אחת מחומצות האמינו (נדיר מאוד). גילוי מוקדם מונע פגיעה מוחית.

בדיקת רופא: עד שש שעות מקבלת התינוק לתינוקיה צריך לבדוק אותו רופא ילדים. רופא הילדים יבחן את התינוק לפי מבחן אפגר: צבע עורו של התינוק, דופק, טונוס שרירים, ונשימה. בנוסף יבדוק הרופא את תקינות אברי המין, שלמות החרך, בדיקה חיצונית (ע"י מישוש) של כל האיברים הפנימיים.

חשוב לזכור שהתינוק הוא שלכם, למדו על הטיפולים הללו ובנו את תפיסת עולמכם. במידה ותפיסת עולמכם לא תואמת את הטיפולים שנעשים ניתן לבקש שהדברים יעשו אחרת.



צהבת ילודים

תופעה שכיחה המופיעה אצל כ-40% מהתינוקות, היא פיזיולוגית ואינה מדבקת וזיהומית. הגורם לצהבת היא פינוי איטי של הבילירובין ממערכת הדם של התינוק בגלל חוסר בשלות של הכבד. ערכי הבילירובין נבדקים בבדיקת דם בערכים נמוכים הנקה וחשיפה לשמש יהיו טיפול הולם, בערכים גבוהים (15 ויותר) ימליצו בטיפול של "אור מלאכותי" (האור עוזר לבילירובין להתפרק. הפוטותרפיה (אור מלאכותי) מחייבת אשפוז של התינוק בבית"ח. ניתן להתנחם בכך שצהבת ילודים חולפת בדרך כלל מהר.